

「左旋莫多草」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 6 月 1 日農授防字第 1121488748E 號公告修正

87.3%(w/w) 左旋莫多草 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
落花生	雜草	1.2 公升	稀釋至 600 公升	播種覆土後。					將藥劑噴於土壤表面。施用時土壤需要潮濕，如土壤乾燥時，施藥後輕輕拌土或鬆土，可增加藥效。	

960 g/L (96% w/v) 左旋莫多草 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
高粱	雜草	1.2 公升	加水至 600 公升	整地後，土壤表面濕潤時，藥液均勻噴施於土壤表面後 7 日播種。					高粱種子及幼苗對除草劑極為敏感，勿任意提高用藥量，以免發生藥害。	
落花生	雜草	1.2 公升	稀釋至 600 公升	播種覆土後。					將藥劑噴於土壤表面。施用時土壤需要潮濕，如土壤乾燥時，施藥後輕輕拌土或鬆土，可增加藥效。	
大豆	雜草	1.2 公升	加水至 600 公升	播種覆土後，均勻					1. 施用時土壤需要潮	本項新增。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
			升	<u>噴施於土壤表面。</u>					<p><u>濕，如土壤乾燥時，施藥後輕輕拌土或鬆土，可增加藥效。</u></p> <p>2. <u>防除對象：牛筋草、稗草、馬唐、碎米莎草、馬齒莧、空心蓮子草、青莧等。</u></p> <p>3. <u>適用於乾大豆。</u></p>	
<u>紅豆</u>	<u>雜草</u>	<u>1.2 公升</u>	<u>加水至 600 公升</u>	<u>播種覆土後，均勻噴施於土壤表面。</u>					<p>1. <u>施用時土壤需要潮濕，如土壤乾燥時，施藥後輕輕拌土或鬆土，可增加藥效。</u></p> <p>2. <u>防除對象：牛筋草、稗草、馬唐、碎米莎草、馬齒莧、空心蓮子草、青莧等。</u></p>	本項新增。