

「波爾多」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 6 月 1 日農授防字第 1121488748G 號公告修正

36%(w/w) 波爾多 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
瓜菜類	露菌病	5 公升	200	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次				
瓜果類	露菌病	5 公升	200	病害發生初期開始施藥。	7	共 3 次				本項新增。

72%(w/w) 波爾多 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
瓜菜類	露菌病	2.5 公斤	400	病害發生初期開始施藥。	7	3				
瓜果類	露菌病	2.5 公斤	400	病害發生初期開始施藥。	7	3				
洋香瓜	露菌病	2.5 公斤	400	病害發生初期開始施藥。	7	3				
楊桃	細菌性斑點病			病害發生初期開始施藥。	7	4			<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期清除罹病枝葉及果實。 2. 雨季來臨前，宜進行預防性施藥。(4-4 式波爾多液) 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
柑桔類	潰瘍病		500	病害發生初期開始施藥。	21	4-6				
觀賞植物	苗檢疫處理			檢疫處理時施藥1次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	